



**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** En caso de emergencia llamar a ESSALUD en línea (línea gratuita): 0801-10200 o 411-8000

### **MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reusarse.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto en envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora. No permitir animales en el área tratada.



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**BLAMAZYME** es un promotor de crecimiento vegetal, promotor (Auxinas, Citoquininas y Giberelinas), de origen natural. Su aplicación ayuda a restablecer la fisiología normal de las plantas para incrementar la cantidad y calidad de las cosechas.

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

### CUADRO DE USO

CULTIVO	DOSIS		FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	L/ha camp.	L/ha aplic.			
PALTO	----	200 - 250 ml/cil 200 L de agua	1ª Al inicio de la floración 2ª Al inicio del cuajado de frutos	N.A.	N.A.
PAPA	1	0,5 0,5	1ª 20 a 25 cm de altura de plantas. 2ª Al inicio de la tuberización.	N.A.	N.A.
TOMATE	1	0,5 0,5	1ª A la floración (20 a 40% de flores abiertas). 2ª 2 a 3 semanas después de la primera aplicación.	N.A.	N.A.
NARANJO, MANDARIÑO	----	1 ml/L de agua	1ª A la floración (20 a 40% de flores abiertas). 2ª Al cuajado de los frutos.	N.A.	N.A.
ZAPALLO	1	0,5 0,5	1ª A la floración (5% de flores abiertas). 2ª 2 a 3 semanas después de la primera aplicación.	N.A.	N.A.
ALGODON	1	0,5 0,5	1ª Al inicio del botoneo. 2ª 3 semanas después de la primera aplicación.	N.A.	N.A.
VID	1,5	0,5 0,5 0,5	1ª Al inicio del botoneo o estado de "piña". 2ª Al inicio de la floración o "cabeza de alfiler". 3ª Al inicio de cuajado.	N.A.	N.A.
ROSAS, CLAVEL CRISANTEMO	1	0,5 0,5	1ª Al inicio de la formación de botones. 2ª 2 a 3 semanas de la primera aplicación.	N.A.	N.A.
FRIJOL, ARVEJA, HABA, PALLAR, FRESA	1	0,5 0,5	1ª Al inicio de la floración. 2ª 2 a 3 semanas después de la primera aplicación.	N.A.	N.A.
CEBOLLA	1	0,3 0,3 0,4	1ª A los 30 días después del trasplante. 2ª A los 60 días después del trasplante. 3ª Al inicio de engrosamiento de bulbo.	N.A.	N.A.
MANZANO, PERAL, MELOCOTON	----	1 ml/L de agua	Al 50 % de flores abiertas.	N.A.	N.A.
PAPRIKA	1	0,5 0,5	1ª Al inicio de la floración 2ª Al inicio del cuajado del fruto	N.A.	N.A.
ALCACHOFA	1	0,5 0,5	1ª Al inicio de la formación del eje floral 2ª 2-3 semanas después de la 1ra aplicación	N.A.	N.A.
MANGO	1	0,5 0,5	1ª Al inicio de la floración 2ª Al inicio del cuajado de frutos	N.A.	N.A.
ARROZ	0,5	0,5	Inicio del macollaje	N.A.	N.A.

**P.C.:**Periodo de Carencia

**L.M.R.:**Límite Máximo de Residuos

**PERIODO DE REINGRESO:** Se puede reingresar al área tratada luego de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** **BLAMAZYME** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional.

**FITOTOXICIDAD:** **BLAMAZYME** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".